

## AGROQUÍMICOS

## HERBICIDAS



# YPF ATRAZINA GRANULADA HD

## DESCRIPCIÓN

Es un herbicida selectivo sistémico y residual, con uso en pre-emergencia y post-emergencia para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas, impidiendo su crecimiento durante varios meses.

El producto es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, provocando la clorosis y la muerte de las malezas, minimizando la competencia de estas con el cultivo. Al estar formulado como gránulos dispersables de una alta concentración, disminuye el traslado de producto, y al ser un producto sólido granulado permite un fácil manejo del mismo, dando así un producto de altísima calidad y seguro para el aplicador.

## DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**  
YPF ATRAZINA GRANULADA HD
- **CATEGORÍA**  
AGROQUÍMICOS
- **FAMILIA**  
HERBICIDAS
- **PRESENTACIÓN**  
BOLSA DE 15 KG

## CONCENTRACIÓN

ATRAZINA 900 GRAMOS I.A. / KILOGRAMO

## FORMULACIÓN

FORMULADO COMO WG  
(GRÁNULOS DISPENSABLES)

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Herbicida a base de Atrazina 900 gramos i.a./kilogramo (Inhib. FII).
- Pre-emergente / Post-emergente de acción sistémica y residual.
- Efectivo en control de malezas latifoliadas y ciertas gramíneas.
- Rápida disolución en tanque y alta compatibilidad con otros herbicidas.
- Por ser una formulación granulada, facilita la dosificación y manipulación.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

### CULTIVO DOSIS (kg/ha) variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación

| Maíz | Tratamiento              | Liviano |        | Medio |        | Pesado |        |
|------|--------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
|      |                          | Total   | Banda* | Total | Banda* | Total  | Banda* |
|      | Pre-siembra              | 2,2     | -      | 2,8   | -      | 2,8    | -      |
|      | Pre-emergencia           | 1,8     | 1,1    | 2,2   | 1,3    | 2,8    | 2      |
|      | Post-emergencia temprana | 2,2     | -      | 2,2   | -      | 2,2    | -      |

Banda de 35 cm. Zona maicera de Buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-siembra.

| Sorgo granífero | Tratamiento              | Medio   |        | Pesado  |        |
|-----------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|
|                 |                          | Total   | Banda* | Total   | Banda* |
|                 | Pre-siembra              | 1,5     | -      | 2       | -      |
|                 | Post-emergencia temprana | 1,2 - 2 | -      | 1,2 - 2 | -      |

Aplicar preferentemente en pre-siembra incorporando la Atrazina 2 a 3 semanas antes de sembrar, o en su defecto, en pre-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). Recomendamos precaución en aplicaciones de post-emergencia luego de sembrar y cuando ésta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, ya que puede presentarse fitotoxicidad, sobre todo en suelos livianos.

## AGROQUÍMICOS

## HERBICIDAS

## YPF ATRAZINA GRANULADA HD

**CULTIVO** DOSIS variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación

| Caña de azúcar                                | Tratamiento         | Suelos livianos     | Suelos pesados      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Cobertura total     | 3,3 kg por hectárea | 3,3 kg por hectárea |
| En banda de 70 cm por surco de 100 m de largo | 22 gramos por surco | 22 gramos por surco | 22 gramos por surco |

Caña, planta o soca. Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1-2 hojas.

**MOMENTOS DE APLICACIÓN**

- a) **Presiembra.** Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas aplicando YPF ATRAZINA GRANULADA HD desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar. Incorporar el producto de 3 a 5 cm de profundidad utilizando rastras rotativas (2) cruzadas.
- b) **Preemergencia.** Aplicar YPF ATRAZINA GRANULADA HD luego de la siembra y previa aparición de las malezas preferiblemente sobre el terreno húmedo o después de la lluvia.
- c) **Postemergencia temprana.** La aplicación de YPF ATRAZINA GRANULADA HD debe realizarse sobre malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengan 3 - 5 hojas, y las gramíneas 1 - 2 hojas. En todos los casos debe moverse el suelo tratado lo menos posible para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar.

**MANIPULEO Y ALMACENAJE**

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales.

**PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO**

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

**RECOMENDACIÓN**

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

**PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

Mayo 2016

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica  
0810-222-YPFD

ypf.com